


No.(Bio/B-1 (NIFA)/2006)

مونگ

کیٹی ترقی دادہ قسم ”رمضان“ اور اس کی کاشت کیلئے سفارشات



جھیری ادارہ برائے خوراک و زراعت (پینا) ترناب پشاور

جولائی۔2006

موگ کی ترقی دادہ قسم۔ ”رمضان“

تعارف:

موگ پاکستان کی موسم خریف میں سب سے زیادہ رقبے پر کاشت ہونے والی دال کی فصل ہے اور اس کو آسانی کیساتھ کم ذرخیز زمینوں پر کاشت کیا جاسکتا ہے۔ ان زمینوں پر خریف کی دوسری فصلیں کاشتکاروں کے لئے موگ کے مقابلے میں کم نفع بخش ہوتی ہیں۔ غذائی اعتبار سے بھی موگ بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ خوراک میں لحمیات کی کمی کو دور کرنے کے لئے گوشت کا سستا اور معقول نعم البدل ہے۔

صوبہ سرحد میں موگ کی دو اقسام ”کرک موگ۔ 1“ اور ”سوات موگ۔ 1“ ذریعہ تحقیقاتی مراکز کرک اور بیگورہ سوات میں تیاری کی جانچکی ہیں جو حکومت صوبہ سرحد نے بالترتیب سال 2003 اور 2004 میں عام کاشت کیلئے منظور کیں۔ یہ دونوں اقسام ملک میں پہلے سے موجود موگ کی منظور شدہ اقسام سے انتخاب کر کے تیاری کی گئی ہیں۔ صوبہ سرحد میں موگ کی کاشت کیلئے مناسب رقبہ میسر ہے اور اس کی پیداوار بڑھانے کے یقینی امکانات موجود ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبے کے موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر بہتر پیداواری صلاحیت رکھنے والی موگ کی اقسام پیدا کی جائیں۔

نیفا کے سائنسدانوں نے اس ضرورت کو محسوس کر کے موگ کی فصل پر کام شروع کیا اور کئی سالوں کی انتھک محنت اور کاوشوں کے بعد موگ کی چھوٹے قد اور بہتر پیداواری صلاحیت رکھنے والی قسم ”رمضان“ موگ کی بیرونی قسم VC1482C اور مقامی قسم NM92 کے دو نمونے کے طریقے کے ذریعے تیاری۔ ہمارے کسان بھائی اس کو اپنی زمینوں پر کاشت کر کے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

زیر نظر کتابچہ میں موگ کے کاشتکار بھائیوں کی رہنمائی کے لئے نیفا کے موگ کی ترقی دادہ قسم ”رمضان“ کی کاشت کے متعلق ضروری سفارشات مرتب کی گئی ہیں۔ جن پر عمل پیرا ہو کر زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے سفارشات:

زمین کی تیاری۔

رستی میرا سے بھاری میرا زمین زیادہ موزوں ہے۔ کلرٹھی اور سم زدہ زمین قطعاً مناسب نہیں۔ زمین کی تیاری کے لئے تین مرتبہ بل چلا کر سہاگہ دیں۔

کھاد کا استعمال۔

ایک بوری ڈی اے پی ٹی ایکڑ کے حساب سے یوآئی کے وقت۔

شرح بچ۔

10 کلوگرام تا 12 کلوگرام فی ایکڑ کے حساب سے۔

کاشت کا وقت اور طریقہ۔

موسم بہار۔ صوبہ سرحد کے دالوں کی کاشت والے علاقوں میں یکم مارچ سے لیکر 15 مارچ تک۔
موسم گرما۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں 15 مئی سے لیکر 30 مئی تک۔

صوبے کے دوسرے دالوں کی کاشت والے علاقوں میں 15 جون سے لیکر 15 جولائی تک۔
ڈرل یا کیرا سے بیج 5 سنٹی میٹر کی گہرائی تک کاشت کریں اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 30 سنٹی میٹر رکھیں۔

چھدرائی۔

بیج کے اگاؤ کے 7 تا 10 دن بعد چھدرائی کریں اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 سنٹی میٹر رکھیں۔

آب پاشی۔

موسم بہار۔ موسمی حالات کی مناسبت سے 2 سے 3 دفعہ آب پاشی کرنی چاہیے۔

پہلا پانی فصل کے اگاؤ کے تیسرے یا چھوتے ہفتے کے دوران۔ دوسرا پانی پھلیاں بننے کے دوران۔ تیسرا پانی پھلیوں میں دانہ بننے کے وقت۔

موسم گرما۔ موسم گرما میں مون سون کی بارشوں کے سبب آب پاشی کی ضرورت نہیں پڑتی تاہم اگر موسم مسلسل خشک رہے تو آب پاشی کی جو ترتیب موسم بہار کے لئے تجویز کی گئی ہے وہ ترتیب موسم گرما کیلئے بھی رکھیں۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی۔

پہلا پانی دینے سے پہلے خشک گودھی جڑی بوٹیوں کی تلفی میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ پانی دینے کے بعد وتر آنے پر جڑی بوٹیاں ختم کریں۔ بوٹی سے قبل شام بھاسا ایک لیٹر استعمال کرنے سے جڑی بوٹیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

کیزوں کا تدارک۔

پھلیاں بننے پر سنڈیوں کا حملہ موسم بہار اور موسم گرما دونوں فصلوں پر یکساں ہوتا ہے۔ لیکن حملے کے ابتدائی دنوں میں مناسب انسکلیسیائیڈ (زہر) سپرے کرنے سے اس پر پوری طرح قابو پایا جاسکتا ہے۔

برداشت۔

جب 90 فی صد پھلیاں پک جائیں تو فصل کو صبح کے وقت کاٹ لیں اور کھیت میں خشک ہونے کیلئے چھوڑ دیں۔ دو تین دن بعد پودوں کو الٹ دیں۔ خشک ہونے کے بعد تھریش سے گہائی کر لیں۔ دانوں کو چند دن دھوپ میں خشک کر کے اسٹور کر لیں جس سے بیج کو کیز لگنے سے کافی حد تک بچایا جاسکتا ہے۔

پیداوار۔

اچھے موسمی حالات اور فصل کی بہتر دیکھ بھال سے 12 سے 15 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

نوٹ: مزید معلومات کیلئے نيفا کے متعلقہ سائینس دانوں سے رجوع کریں۔

فون: 091-2964058/091-2964060 فیکس: 091-2964059

E-mail: nifa@pes.comsats.net.pk

تحقیق و تحریر:

ڈاکٹر گل سنت شاہ (پرنسپل سائنسٹ)

اقبال سعید (ریسرچ فیلو)